

NEMOCI

Odhalení nemocí

Rotvajleři jsou všeobecně zdraví psi, ale může se samozřejmě vždycky přihodit, že náš pes začne mít nějaké potíže. Určitě si toho všimnete, protože se bude chovat jinak než normálně. Všechny odchylky od normálního každodenního chování, které zaregistrujete - ať jsou to změny v chování, změny v přijímání potravy nebo míra určitého druhu pohybu - mohou vést ke skrytým nebo dokonce naléhavým potížím. Následující popis různých nemocí a problémů není vyčerpávající, ale mohl by vám sloužit alespoň pro orientaci. Pokud si nejste jisti, že je pejsek zdravý, měli byste vždy kontaktovat zvěrolékaře. Je lepší nechat psa důkladně prohlédnout, než aby měl trpět.





Dysplazie kyčelních kloubů

Dysplazie kyčelních kloubů je částečně dědičná, ale může se zhoršit při neustálé nadměrné zátěži

Problémy s kostmi, kostrou a klouby se u velkých a rychle rostoucích plemen jako je rotvajler vyskytují relativně často. Dysplazie kyčelních kloubů je nejznámějším z těchto problémů. Dysplazie zahrnuje různé vady ve spojení mezi jamkou kyčelní kosti a hlavicí stehenní kosti. Dysplazie kyčelních kloubů je částečně dědičná, ale roli hrají také vnější faktory, jako příliš točivých pohybů, chůze po schodech, přílišná únava mladých psů při růstu nebo chybná strava. Jistotu o postižení



psa touto chorobou budeme mít až po provedení rentgenových snímků. Na způsobu chůze nebo poloze vleže se to poznat nedá, nemoc můžeme nanejvýš předpokládat. Někteří psi mají těžkou dysplazii kyčelních kloubů, aniž by to někdo poznal, jiní mají naopak lehkou formu a přesto mají velké potíže. Příznaky, které mohou signalizovat dysplazii: potíže se vstáváním, kňučení, když se dotknete kloubů či potíže s chůzí. Dysplazie kyčelních kloubů je pro psa velice bolestivá a bohužel se s ní nedá nic moc dělat. Řešením může být operace, která je však obvykle velice nákladná a provádí se jen na několika málo klinikách. Abychom předešli problémům s dysplazií, poříďme si pouze štěňátko z rodu, který neměl potíže (nebo jen ojedinele) s touto chorobou. Kromě toho by se psi během fáze



Způsob chůze nebo ležení psa nemusí vypovídat o kvalitě kyčlí

růstu měli pohybovat jen v kratších intervalech. Nejlepším pohybem ve fázi růstu je běh na rovině, krátké trati. Strava musí mít výbornou kvalitu a nikdy nesmí obsahovat příliš bílkovin, protože umocňuje rychlý růst, a tak příliš zatěžuje tělesnou soustavu.

Zánět dělohy

Zánět dělohy se nejčastěji objevuje u starších fen. Fena je bez energie, pije relativně hodně a má horečku. Existují dvě různé formy zánětu dělohy.

Otevřený zánět dělohy se vyznačuje kalným výtokem z vulvy, zatímco fena s uzavřeným zánětem dělohy žádný výtok nemá. Pokud máme podezření, že má naše fena zánět dělohy, domluvíme si okamžitou návštěvu u zvěrolékaře. Zánět dělohy může delší dobu podřimovat, ale nakonec může skončit smrtí. Pokud zánět včas zjistíme, mohou někdy pomoci léky, v ostatních případech však bude děloha muset být odstraněna.

Zánět předkožky

Zánět předkožky je celkem nevinným, ale velice nepříjemným problémem, který se vyskytuje nápadně často. Lze ho jednoduše rozpoznat podle žlutozeleného kalného výtoku z předkožky. Pomocí pravidelných výplachu, které předepíše zvěrolékař, lze proti zánětu bojovat, ale bohužel většinou pomáhají pouze dočasně.

*Zánět dělohy se
nejčastěji vyskytuje
u starších fen*

Alergie

Pokud se pes neustále škrábe na tlapkách, silně líná a má přítom na kůži stroupky, šupinky a bouličky, je možné, že je alergický na určitou látku. Někdy působí pes otekle, má neustále znečištěné oči a červenou kůži. Tím, jak se pes sám škrábe a kouše, porušuje si kůži a někdy i uši, čímž vznikají poranění a v pozdějším stádiu také trvalé výrůstky na kůži. Alergie se bohužel vyskytují stále častěji a jejich příčiny není vždy jednoduché určit. Pes může mít například alergickou reakci na určitou složku potravy, na blechy, na podlahovou krytinu v domě, na pyl a trávu, na jiná zvířata a čisticí prostředky. Aby se zjistilo, jaká látka vzbuzuje u psa alergii, napíchne mu zvěrolékař několik provokačních látek pod kůži. Místo, kam se látka vsťfíkne, v krátké době silně oteče. Zvěrolékař nám může doporučit vhodnou léčbu, ale v některých případech nepřináší žádná léčba úspěch. Měli bychom vědět, že ne všechny alergie jsou prokazatelné. Existují totiž také psi, kteří se pod vlivem stresu neustále koušou a drbou. Málo pozornosti nebo pohybu způsobuje u některých psů takové napětí, že začnou mít příznaky jako při alergii. „Obyčejné“ drbání může být také následkem blech, vši nebo roztočů v srsti. Zvíře je před testem na alergii samozřejmě nejdříve prohlédnuto, zda tyto parazity nemá.

Průjem

*Alergie mohou mít
různé příčiny*

Psi mají relativně často potíže s průjmem, který většinou nesignalizuje nic vážného. Rotvajler se venku napít z louže,





*Rotvajleři jsou
všeobecně zdraví
psi*

příliš se unavil nebo snědl něco špatného. Za dva dny průjem většinou sám od sebe přejde. Dieta z vařené rýže a kuřecího bujónu, které předchází den hladovění, ve většině případů uvede stolici do normálního stavu. Jiná situace je, když průjem neustává, má neobvyklou barvu nebo se současně objevují i jiné příznaky. V těchto případech samozřejmě nebudeme sami experimentovat, ale vždy se poradíme se zvěrolékařem.



Torze žaludku

Torze žaludku se u rotvajlerů příliš nevyskytuje, ale vzhledem k rychlému průběhu se smrtelným koncem je důležité, aby-



Normální tělesná teplota je (měřeno v konečniku) 37,5 až 38 °C. O horečce mluvíme při teplotě od 39 °C.

chom symptomy této nemoci rychle odhalili. Z neznámých příčin se žaludek otočí kolem své osy, čímž se zauzlují otvory do hltanu a střev. Obsah žaludku začne kvasit, a žaludek začne rychle otékat. Často to jde tak rychle, že otékání doslova vidíme před očima. Žaludek se nachází v levé části těla a otok je patrný těsně za žebry. Tlačení otékajícího žaludku na cévy dostane pes šok a umírá poměrně rychle poté. Pes často vypadá, že chce žaludek vyprázdnit, ale nevyjde z něj nic kromě trochy hlenů. Pokud se domníváme, že pes má torzi žaludku, je dobrá každá vteřina. Zkušený zvěrolékař ví, jak naléhavá a vážná je torze žaludku a nebude se rozčilovat, když ho vzbudíme uprostřed noci. Odborníci se domnívají, že torze může být způsobena podáním velkého množství potravy najednou nebo přílišným vzrušením ihned po jídle.

Problémy s kostmi se mohou ve starším věku zhoršit



